

こどものかかりやすい伝染性病気

病名	症状	登園できない期間のめやす
インフルエンザ	高熱、のどの痛み、咳が出る	発症から5日を経過し、かつ解熱後3日を経過するまで
百日咳	コンコンと短い呼気の咳を連発し、ヒューと深い1回の呼気をする	特有の咳が消失するまで
麻疹 (はしか)	熱、咳、くしゃみ、鼻水などが、2～3日続いてから、ほほの内側に白い斑点、発疹ができる	解熱した後3日を経過するまで
急性灰白髄炎 (ポリオ)	片手、片足のマヒ、力なくダラリとしている両手、両足、四肢、全身のマヒを起こす	急性期の主要症状が消退するまで
ウィルス性肝炎	吐き気、嘔吐、下痢が起きる、咳、頭痛、痰、咽頭炎などの感冒症状	主要症状が消退するまで
流行性腎炎	食欲不振や倦怠感、まぶたがはれぼったい、尿の色が赤っぽく、おしっこの回数が多い	主要症状が消退するまで
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	熱が出て、耳下からあごにかけてはれる	耳下腺のはれが消失するまで
風疹 (3日はしか)	熱とともに発疹がでる、耳や首の後ろのリンパ節がはれる	発疹が消失するまで
水痘 (水ぼうそう)	全身の発疹、水痘となって茶色のかさぶたになる	すべての発疹が、かさぶた化するまで
咽頭結膜炎 (プール熱)	のどの痛み、目の充血や発熱	主要症状が消退した後2日を経過するまで
伝染性皮膚炎 (とびひ、水いぼ)	皮膚、手足、身体、顔に発疹や水泡、膿汁が出る	主要症状が消退するまで 医師が認めたとき
溶連菌感染症	急な発熱、首、胸、背中、腹、手足の順に発疹、舌の先にいちご上のブツブツが出る	解熱した後3日を経過するまで
流行性角結膜炎 (はやり目)	多量の目やに、結膜の充血	主要症状が消退するまで

※治癒証明書を提出してから登園してください。